

Patient personnummer: \_\_\_\_\_

Efternamn: \_\_\_\_\_ Förnamn: \_\_\_\_\_

Ålder vid registrering:  5år  10år  16år  19år  1 år postop ortognatUndersökningsdatum: \_\_\_\_\_  ej kommit  följs ej vidare**Modifierat Huddart Bodenham index** (vid 5år, 10år, 19år, 1år postop ortognat)  ej möjligt

Anterior poäng 1 + 1	Höger sida / posterior poäng 3 + 4 + 5 + (6)	Vänster sida / posterior poäng 3 + 4 + 5 + (6)
Σ=	Σ=	Σ=

**Bedömning av incisiver**

**Bedömning av hörntänder**

**Bedömning av premolarer/molarer**

**Beräkning av MHB**

Saknad central incisiv – samma poäng som andra centrala incisiven

Saknad hörntand – poängsatt efter kristatoppen

Saknad primär molar / premolar – poäng som intilliggande premolar (saknas tänder siktas efter kristans mitt)

Vid alla åldrar: båda centrala incisiver  
= summa poäng för 2 tandpar

Vid 5 år: hörntand + 2 primära molarer  
= summa poäng för 3 tandpar

Vid 10, 19 år & 1 år postop: hörntand + 2 premolarer + 1 molar  
= summa poäng för 4 tandpar

Vid 10 år:

**Agenesi permanenta tänder** (gäller ej 8or). Ange tand/tänder: \_\_\_\_\_  ej möjligt

Vid 5år, 10 år, 19 år samt 1 år postop ortognat: kliniska fotografier, studiemodeller, profilröntgen.

**Kefalometri:**SNA: \_\_\_\_\_ SNB: \_\_\_\_\_ NAPg: \_\_\_\_\_ NSL/NL: \_\_\_\_\_ NSL/ML: \_\_\_\_\_  ej möjligt

Vid 16 år:

Bentransplantation:  Ja  NejOrtodonti före bentransplantation  Ja  Nej**Bergland index** (bennivå mäts på bitplansröntgen över spaltområdet och bedöms i förhållande till rotlängden på tanden anterior om spalten)Höger sida  I: Normal bennivå  II:  $\geq \frac{3}{4}$   III:  $< \frac{3}{4}$   avsaknad benbrygga  ej tillämpligtVänster sida  I: Normal bennivå  II:  $\geq \frac{3}{4}$   III:  $< \frac{3}{4}$   avsaknad benbrygga  ej tillämpligt