

Patient personnummer: _____

Efternamn: _____ Förnamn: _____

Ålder vid registrering: 5år 10år 16år 19år 1 år postop ortognat

Undersökningsdatum: _____ ej kommit följs ej vidare

Modifierat Huddart Bodenham index (vid 5år, 10år, 19år, 1år postop ortognat) ej möjligt

Anterior poäng 1+1	Höger sida / posterior poäng 3 + 4 + 5 + (6)	Vänster sida / posterior poäng 3 + 4 + 5 + (6)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Σ=	Σ=	Σ=

Bedömning av incisiver

Bedömning av hörntänder

Bedömning av premolarer/molarer

Beräkning av MHB

Saknad central incisiv – samma poäng som andra centrala incisiven

Saknad hörntand – poängsatt efter kristatoppen

Saknad primär molar / premolar – poäng som intilliggande premolar (saknas tänder siktas efter kristans mitt)

Vid alla åldrar: båda centrala incisiver
= summa poäng för 2 tandpar

Vid 5 år: hörntand + 2 primära molarer
= summa poäng för 3 tandpar

Vid 10, 19 år & 1 år postop: hörntand + 2 premolarer + 1 molar
= summa poäng för 4 tandpar

<p>5-year-index</p> <p>"Atack"</p> <p><input type="checkbox"/> ej möjligt</p>	<input type="checkbox"/> 1. Positiv horisontell överbitning med normalt inklinerade eller retroklinerade incisiver. Inga korsbett eller öppna bett.	
	<input type="checkbox"/> 2. Positiv horisontell överbitning med normalt inklinerade eller proklinerade incisiver. Enkelsidigt korsbett. Tendens till öppet bett i spaltområdet.	
	<input type="checkbox"/> 3. Kant-i-kant-bett med normalt inklinerade/proklinerade incisiver. Inverterad front med retroklinerade incisiver. Unilaterala korsbett. Tendens till öppet bett i spaltområdet.	
	<input type="checkbox"/> 4. Negativ horisontell överbitning med normalt inklinerade eller proklinerade incisiver. Uni- eller bilateralt korsbett. Tendens till öppet bett i spaltområdet.	
	<input type="checkbox"/> 5. Underbett med proklinerade incisiver. Bilateralt korsbett. Otillfredsställande bågform i överkäken samt otillfredsställande gomanatomi.	

OBS: när patienten genomgått ortognat kirurgi före 19 års ålder ersätts 19-års-data av preop-data.

Goslon (vid 10år, 19år samt 1 år postop ortognat)

ej möjligt



Anterioposterior bedömning

Vid dentoalveolär kompensering med uttalad proklination av överkäksncisiverna samt reklination av underkäksncisiverna bör en högre kategori övervägas. Om incisivlutning eller djupt bett medför övervärdering av svårighetsgraden bör en lägre kategori övervägas.

Vertikal bedömning

Fördelaktiga vertikala förhållanden (dvs djupa bett) indicerar ingen förändring av kategori förutom i grännsfall. Ringa vertikal överbitning eller frontalt öppna bett föreslås ge högre kategori.

Transversell bedömning

En normal transversell relation eller korsbett som kan behandlas ortodontiskt indicerar inget byte av grupp. En markerad maxillär konstriktion med bilateralt korsbett kan medföra en högre kategori.

Vid 10 år:

Agenesi permanenta tänder (gäller ej 8or). Ange tand/tänder: _____ ej möjligt

Vid 5år, 10 år, 19 år samt 1 år postop ortognat: kliniska fotografier, studiemodeller, profilröntgen.

Kefalometri:

SNA: _____ SNB: _____ NAPg: _____ NSL/NL: _____ NSL/ML: _____ ej möjligt

Vid 16 år:

Bentransplantation: Ja Nej

Ortodonti före bentransplantation Ja Nej

Bergland index (bennivå mäts på bitplansröntgen över spaltområdet och bedöms i förhållande till rotlängden på tanden anterior om spalten)

Normal bennivå $\geq 3/4$ $< 3/4$ avsaknad benbrygga ej tillämbart